


Desinfekce

Persteril® 15

virucidní účinek



účinná složka : kyselina peroxyoctová (PAA) a peroxid vodíku

Dezinfekce prostor - institucionální oblasti

Systém aplikace:	omývání, postřik
Účinnost přípravku	ABCTMV
	Vysoce účinný na viry, odolné plísně, spory
Vhodné materiály	plasty, sklo, keramika
	<u>Koncentrát</u> není vhodný na dezinfekci barevných kovů, oceli a gumy, kde působí korosivně.
	Aplikační roztoky lze použít bez omezení.

Pracovní postup:

omytí stanoveným aplikačním roztokem, možno použít i v kombinaci s detergentem.

Aplikační koncentrace:

vyšší stupeň dezinfekce – 1% aplikační roztok / 15 min. / 20 °C

Příprava 1% aplikačního roztoku

na 1 l aplikačního roztoku		na 5 l aplikačního roztoku	
Persteril® 15	voda	Persteril®15	voda
10 ml	990 ml	50 ml	4950 ml

Roztok připravit ředěním přípravku do studené vody, denně čerstvý před použitím.

Je bezpodmínečně nutné dodržet koncentraci roztoku a dobu působení!

Při práci je nutno dodržovat bezpečnost práce při ředění přípravku, pokyny jsou uvedeny na každém balení.

Používejte dezinfekční přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku!

Pořízení, držení nebo použití osobami z řad široké veřejnosti podléhá omezení.